



Bonqat®

Benutzerhandbuch

Ihr Tierarzt hat Ihrer Katze Bonqat® zur Linderung von akuten Angstzuständen und Ängsten, im Zusammenhang mit Transport und Tierarztbesuchen, verschrieben.

Meine Katze wiegt: _____ kg

Die Bonqat®-Dosis für meine Katze beträgt: _____ ml

Befolgen Sie stets die vom Tierarzt verschriebene Dosierung.

Lagern Sie Bonqat® im Kühlschrank (2°C–8°C).



Wir hoffen, dass dieses Handbuch Ihnen hilft, Bonqat® korrekt und sicher anzuwenden. Die Informationen in diesem Handbuch basieren auf der Packungsbeilage von Bonqat®. Bitte lesen Sie sowohl das Handbuch als auch die vollständige Packungsbeilage, um alle Informationen zu erhalten.

Inhaltsverzeichnis

Was ist Bonqat®?	S. 3
Wie funktioniert Bonqat®?	S. 3
Wann sollte Bonqat® angewendet werden	S. 4
Dosierung	S. 4
Hinweise für die Person, die Bonqat® verabreicht	S. 4
Anwendung von Bonqat® bei Ihrer Katze?	S. 4
Lagerung	S. 6



Dômes Pharma | TVM Tiergesundheit GmbH
Reuchlinstraße 10-11, 10553 Berlin

T: +49 (30) 23 59 23 200 | E: kontakt@domespharma.com | www.domespharma.de

Was ist Bonqat®?

Bonqat® ist eine orale Lösung für Katzen, die 50 mg/ml des Wirkstoffs Pregabalin enthält und eine angstlindernde Wirkung besitzt.

Wie funktioniert Bonqat®?

- Bonqat® lindert akute Angstzustände und Ängste im Zusammenhang mit Transporten und Tierarztbesuchen.
- Die volle Wirkung tritt nach 1,5 Stunden ein und hält nach der Verabreichung etwa 7 Stunden an.

Hinweis

- Nach der Verabreichung kann es zu einem Absinken der Körpertemperatur kommen. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Katze in einer geeigneten Umgebungstemperatur befindet.
- Sollte Ihre Katze nach der Behandlung schläfrig wirken oder andere Anzeichen übermäßiger Wirkung zeigen, halten Sie sie im Haus. Futter oder Wasser sollten erst angeboten werden, wenn eine vollständige Erholung eingetreten ist.

Unerwünschte Reaktionen

- Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei diesem Nebenwirkungen auftreten, die jedoch nicht bei allen Katzen beobachtet werden. Falls Nebenwirkungen auftreten, informieren Sie bitte Ihren Tierarzt.
- In klinischen Studien wurden häufig Anzeichen von Sedierung (Müdigkeit, Gleichgewichtsprobleme, Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung von Körperposition und -bewegung) sowie Erbrechen beobachtet. Diese Anzeichen sind in der Regel mild und vorübergehend.
- Bei einer Überdosierung treten die gleichen Nebenwirkungen häufiger, stärker ausgeprägt und langanhaltender auf. Halten Sie Ihre Katze warm und wenden Sie sich an Ihren Tierarzt, um weitere Anweisungen zu erhalten.

Wann sollte Bonqat® angewendet werden?

- Verabreichen Sie Bonqat® ca. 1,5 Stunden vor Beginn des Transports oder des geplanten Tierarztbesuchs.
- Befolgen Sie stets den Rat Ihres Tierarztes.

Dosierung

- Die empfohlene Dosis beträgt 0,1 ml/ kg Körpergewicht. Befolgen Sie stets die vom Tierarzt verschriebene Dosierung.

Dosierungsbeispiele

2 kg	4 kg	6kg	12 kg
0,2ml	0,4ml	0,6ml	1,2ml

Wiegt die Katze mehr als 10 kg, sollte die verschriebene Menge in zwei Dosen verabreicht werden, da die Spritze maximal 1,0 ml Lösung fasst.


- Wenn die Katze einen Teil der Dosis ausspuckt, nach der Behandlung erbricht oder übermäßigen Speichelfluss zeigt, geben Sie keine weitere Dosis.


Hinweise für die Person, die Bonqat® verabreicht

- Kontakt mit Haut, Augen oder Schleimhäuten vermeiden. Waschen Sie die Hände unmittelbar nach der Verabreichung gründlich.
- Bei versehentlichem Kontakt mit den Augen oder Schleimhäuten spülen Sie diese Gründlich mit Wasser. Suchen Sie ärztlichen Rat auf, falls Symptome wie Schwindel, Müdigkeit, Gleichgewichtsprobleme oder verschwommenes Sehen auftreten.
- Bei Hautkontakt die betroffene Stelle mit Wasser und Seife reinigen.
- Informieren Sie den Tierarzt, wenn Bonqat® der Katze vor dem Besuch verabreicht wurde.


Anwendung von Bonqat® bei Ihrer Katze

- Bonqat® kann entweder direkt oral gegeben oder mit einer kleinen Menge Futter vermischt werden. Große Futtermengen können den Wirkungseintritt jedoch
- Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene Spritze.







1. Die Verschlusskappe von der Flasche entfernen (nach unten drücken und drehen). Die Verschlusskappe zum Wiederverschließen aufbewahren.




2. Den Kolben bis auf den Boden des Spritzenzylinders drücken, um die gesamte Luft aus der Spritze zu entfernen. Setzen Sie die Spritze fest in den Adapter am Flaschenhals ein.



3. Halten Sie die Flasche mit der Spritze im Adapter nach unten. Ziehen Sie den Kolben heraus, bis die schwarze Linie für die richtige Dosis (die vom Tierarzt verordnete ml-Menge) unter der Griffplatte der Spritze sichtbar ist. Lassen Sie die gefüllte Dosierspritze nicht unbeaufsichtigt.



4. Führen Sie die Spritze vorsichtig in das Maul der Katze ein und verabreichen Sie die Dosis am Zungenansatz, indem Sie den Kolben langsam drücken, bis die Spritze leer ist.



5. Setzen Sie den Verschluss wieder auf die Flasche und spülen Sie Spritze nach der Anwendung mit Wasser aus. Bewahren Sie die Spritze und die Flasche in der Originalverpackung auf und lagern Sie sie im Kühlschrank.

Lagerung


- **Bewahren Sie Bonqat® im Kühlschrank (2°C -8°C)** auf und verwenden Sie es innerhalb von 6 Monaten nach dem ersten Öffnen.
- Bonqat® kann für kurze Zeiträume (bis zu 1 Monat insgesamt) bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.
- Nach dem Ablaufdatum nicht mehr verwenden.
- Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.

Häufige Anzeichen von Angst bei Katzen

Katzen, die unter akuten Angstzuständen oder Angst leiden, können Verschiedene Anzeichen zeigen. Lernen Sie, wie Ihre Katze auf stressige Situationen reagiert, um es frühzeitig zu erkennen.



Angelegte Ohren



**Fluchtverhalten
und/oder
Verstecken**



Schwanzschlagen




**Häufiges
Lecken/Pflegen**




Übermäßiges Vokalisieren



Kauern



**Schnelles
Atmen/Hecheln**



**Unruhiges
Umherlaufen**



Erweiterte Pupillen



**Aggressives
Defensivverhalten**



DÔMES PHARMA - TVM TIERGESUNDHEIT GMBH

REUCHLINSTRASSE 10-11, 10553 Berlin - DEUTSCHLAND

T: +49 (30) 23 59 23 200

E: kontakt@domespharma.com

www.domespharma.de