

BesitzerInnen zögern möglicherweise, die Exposition zuzugeben, und/oder wissen nicht, dass sie ihr ausgesetzt sind. Siehe unten für Kommunikationstipps und Diagnose.







Dômes Pharma –
TVM Tiergesundheit GmbH ;
www.domespharma.de
kontakt@domespharma.com
T : 030 23 59 23 200

Berlin:	030/19240
Bonn:	0228/19240
Erfurt:	0361/730730
Freiburg:	0761/19240
Göttingen:	0551/19240
Hamburg/Saar:	06841/19240
Mainz:	06131/19240
München:	089/19240

Pflichttexte und Referenzen: siehe Rückseite
Für weitere Informationen siehe entsprechende aktuelle Gebrauchs-/Fachinformation oder kontaktieren Sie uns.

PRODUKTE

- Injektionslösung mit Wirkstoff: Apomorphin
- Für Hunde
- Auslösen von Erbrechen
- 1 ml Ampullen mit 1 mg/ml
(1 Ampulle pro 10 kg)
- 0,1 ml/kg einmalig s.c.
(= 0,1 mg/kg einmalig s.c.)



Referenzen:

1. Brutlag, A. G.; Hommerding, H. (2018) Toxicology of Marijuana, Synthetic Cannabinoids, and Cannabidiol in Dogs and Cats. In: Vet Clin North Am Small Anim Pract, vol.48, n°6, p.1087-1102.
2. Fitzgerald, Alyson H.; Zhang, Yuntao; Fritz, Scott; Whitehouse, William H.; Brabson, Tamera; Pohlman, Lisa et al. (2021) Detecting and quantifying marijuana metabolites in serum and urine of 19 dogs affected by marijuana toxicity. In: Journal of Veterinary Diagnostic Investigation : Official Publication of the American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians, Inc, vol.33, n°5, p. 1002-1007.
3. Ramesh C. Gupta, éd. (2018) Veterinary toxicology. Basic and clinical principles. 3e édition. London, United Kingdom:Elsevier/Academic Press.
4. Janeczek, Agnieszka; Zawadzki, Marcin; Szpot, Pawel; Niedzwiedz, Artur (2018) Marijuana intoxication in a cat. In: Acta Veterinaria Scandinavica, vol.60, n°1, p.44.
5. Allerton, F. (2020). Small Animal Formulary, 10th Edition. Part A: Canine and Feline. British Small Animal Veterinary Association.

Zulassungsinhaber: Zulassungsinhaber: Dômes Pharma, 3 Rue André Citroën, 63430 Pont-du-Château, Frankreich. **Mitvertrieb DE/AT:** TVM Tiergesundheit GmbH, Reuchlinstraße 10-11, 10553 Berlin, Deutschland. **ZIAPAM, 5 mg/ml, Injektionslösung für Katzen und Hunde - Wirkstoff:** Diazepam. Sonstige Bestandteile: Benzylalkohol (E1519) 15,7 mg; Benzoessäure (E210) 2,5 mg; Natriumbenzoat (E211) 47,5 mg. Die vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile finden Sie in der Fachinformation. **Anwendungsgebiet(e):** Bei Katzen und Hunden: Für die kurzzeitige Behandlung von Krampfanfällen und Spasmen der Skelettmuskulatur sowohl zentralen als auch peripheren Ursprungs. Zur Narkoseprämedikation oder Sedation. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht anwenden bei Tieren mit schweren Lebererkrankungen. **Nebenwirkungen:** Eine zu schnelle intravenöse Verabreichung kann zu arterieller Hypotonie, kardialer Beeinträchtigung und Thrombophlebitis führen. In seltenen Fällen treten, hauptsächlich bei kleinen Hunderassen, paradoxe Reaktionen auf (wie Exzitation, Aggression, enthemmende Wirkungen); daher sollte der Gebrauch von Diazepam als alleinigem Wirkstoff bei potentiell aggressiven Tieren vermieden werden. In sehr seltenen Fällen kann Diazepam bei Katzen akute Lebernekrose und Leberinsuffizienz verursachen. Weitere beobachtete Nebenwirkungen sind gesteigerter Appetit (insbesondere bei Katzen), Ataxie, Desorientierung sowie Kognitions- und Verhaltensänderungen. **Besondere Warnhinweise, soweit erforderlich:** Eine versehentliche Selbstinjektion ist gefährlich. Aufgrund dieses Risikos sollten Frauen während der Schwangerschaft und Stillzeit dieses Tierarzneimittel nicht handhaben. Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage. DE: **Verschreibungspflichtig.** AT: Rezept- und apothekenpflichtig. Wartezeit(en): Nicht zutreffend. Stand: 04/2022.

Zulassungsinhaber: Dômes Pharma, 3 Rue André Citroën, 63430 Pont-du-Château, Frankreich. **Mitvertrieb DE/AT:** TVM Tiergesundheit GmbH, Reuchlinstraße 10-11, 10553 Berlin, Deutschland. **EMEDOG, 1 mg/ml, Injektionslösung für Hunde - Wirkstoff:** 1 mg Apomorphin entspricht 1,17 mg Apomorphinhydrochlorid-hemihydrat. Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckmäßige Verabreichung des Mittels erforderlich ist: 1 mg Natriummetabisulfit (E223). Die vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile finden Sie in der Fachinformation. **Anwendungsgebiet(e):** Auslösen von Erbrechen. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei Depression des zentralen Nervensystems (ZNS). Nicht bei Katzen und anderen Tierarten anwenden. Nicht anwenden nach oraler Aufnahme von ätzenden Substanzen (Säuren oder Laugen), schaubildenden Produkten, flüchtigen Substanzen, organischen Lösungsmitteln oder scharfkantigen Gegenständen (z. B. Glas). Nicht anwenden bei Hypoxie, Kurzatmigkeit, Krämpfen, Übererregtheit, extremer Schwäche, Ataxie, Koma, Fehlen des normalen Würgereflexes oder bei Vorliegen anderer ausgeprägter neurologischer Störungen, die zu einer Aspirationspneumonie führen könnten. Nicht anwenden bei Kreislaufversagen, Schock und Anästhesie. Nicht bei Tieren anwenden, die zuvor mit Dopamin-Antagonisten (Neuroleptika) behandelt wurden. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Es können folgende leichte Nebenwirkungen auftreten: Benommenheit (sehr häufig); Veränderung des Appetits (sehr häufig); erhöhte Speichelbildung (sehr häufig); leichte bis mäßige Schmerzen nach Injektion (sehr häufig); leichte Dehydrierung (häufig); veränderte Herzfrequenz (Tachykardie mit anschließender Bradykardie) (häufig). Darüber hinaus wurde aufgrund der Erfahrungen nach dem Inverkehrbringen sehr selten über Ataxie berichtet. **Besondere Warnhinweise, soweit erforderlich-lich:** Apomorphin zeigte bei Labortieren eine teratogene Wirkung und geht in die Muttermilch über. Schwangere oder stillende Frauen sollten den Umgang mit dem Tierarzneimittel vermeiden. DE: **Verschreibungspflichtig.** AT: Rezept- und apothekenpflichtig. **Wartezeit(en):** Nicht zutreffend. Stand: 04/2022.