

Tessie®

Benutzerhandbuch

*Ihr Tierarzt hat Ihrem Hund Tessie®
verschrieben, um situationsbedingte
Angstzustände zu lindern, die durch
Geräusche und/oder Trennung
ausgelöst werden.*

Mein Hund wiegt: _____ kg
Die Tessie®-Dosis für meinen
Hund ist _____ ml

**Halten Sie sich immer an die von Ihrem
Tierarzt verschriebene Dosierung.**

In der Originalschachtel im Kühlschrank
(2°C bis 8°C) aufbewahren.



Wir hoffen, dass dieser Leitfaden Ihnen helfen wird, Tessie® richtig und sicher zu verwenden. Die in diesem Leitfaden enthaltenen Informationen basieren auf der Tessie®-Packungsbeilage. Bitte lesen Sie sowohl den Leitfaden als auch die vollständige Packungsbeilage, um alle Informationen zu erhalten.

Inhaltsverzeichnis

Was ist Tessie®?	S. 3
Wann ist Tessie® zu verwenden?	S. 3
Dosierung	S. 3
Wie verabreichen Sie Tessie® an Ihren Hund?	S. 4
Hinweise für die Person, die Tessie® verabreicht	S. 6
Wie funktioniert Tessie®?	S. 6
Lagerung	S. 7



Was ist Tessie®?

Tessie® ist eine orale Lösung für Hunde, die 0,3 mg/ml des Wirkstoffs Tasipimidin mit angstlösender Wirkung enthält.

Wann ist Tessie® zu verwenden?

Zur Linderung von Trennungsproblemen:

- Geben Sie die Dosis eine Stunde, bevor Sie den Hund allein lassen.

Zur Linderung von Angstzuständen, die durch Geräusche ausgelöst werden:

- Geben Sie die erste Dosis eine Stunde vor dem erwarteten Beginn des Geräuschereignisses oder sobald der Hund die ersten Angstanzeichen zeigt.

Befolgen Sie immer den Rat Ihres Tierarztes.

Verwenden Sie Tessie® nicht, wenn Ihr Hund Anzeichen von z. B. Schläfrigkeit nach einer früheren Verabreichung zeigt. Bitte sprechen Sie im Zweifelsfall zuerst mit Ihrem Tierarzt.

Dosierung

- Die empfohlene Dosis beträgt 1 ml pro 10 kg Körpergewicht oral verabreicht. Möglicherweise hat Ihr Tierarzt Ihrem Hund eine andere Dosis verschrieben. Halten Sie sich immer an die von Ihrem Tierarzt verschriebene Dosierung.

Dosierungsbeispiele

Gewicht des Hundes	Empfohlene Dosis	Hinweis
5 kg	0.5 ml	
20 kg	2 ml	
32 kg	3.2 ml (1.6 ml + 1.6 ml)	Spritze fasst 3 ml
35 kg	3.5 ml (2 ml + 1.5 ml)	Spritze fasst 3 ml
45 kg	4.5 ml (2.5 ml + 2 ml)	Spritze fasst 3 ml

- Wenn der Hund mehr als 30 kg wiegt, muss die verordnete Menge auf zwei Spritzen aufgeteilt werden, da die Spritze maximal 3,0 ml der Lösung fasst.

Wie verabreichen Sie Tessie® an Ihren Hund?

- Verabreichen Sie Tessie® oral. Verwenden Sie die in der Packung enthaltene Spritze.
- Füttern Sie Ihren Hund eine Stunde vor bis eine Stunde nach der Verabreichung von Tessie® nicht: Das Füttern kann den Eintritt der Wirkung verzögern. Geben Sie ein kleines Leckerli, um sicherzustellen, dass der Hund das Arzneimittel schluckt. Wasser kann weiterhin frei verfügbar sein.
- Tessie® ist für den kurzfristigen Gebrauch bestimmt und kann bis zu 9 aufeinanderfolgende Tage bei situationsbedingten Angstzuständen verwendet werden. Bei chronischen Erkrankungen (zum Beispiel Trennungsproblemen) wird eine Verhaltenstherapie empfohlen.
- **Wenn Sie die erste Dosis verabreichen, beobachten Sie den Hund 2 Stunden lang, um sicherzustellen, dass die Dosis nicht zu hoch für ihn ist.** Wenn der Hund schläfrig wirkt, seine Bewegungen unkoordiniert sind oder er langsamer als sonst auf Ihr Rufen reagiert, lassen Sie den Hund nicht allein und wenden Sie sich an Ihren Tierarzt, um die Dosis zu reduzieren.
- Wenn der Hund nach der Verabreichung schläfrig ist, lassen Sie ihn nicht allein, geben Sie kein Futter oder Wasser und halten Sie ihn warm.


Zur Linderung von Angstzuständen, die durch Geräusche ausgelöst werden:

- Geben Sie die erste Dosis eine Stunde vor dem erwarteten Beginn des Geräuschereignisses oder sobald der Hund die ersten Angstanzeichen zeigt. Beobachten Sie den Hund. Wenn das Geräusch anhält und der Hund wieder Angstanzeichen und Furcht zeigt, kann eine neue Dosis verabreicht werden, wenn mindestens 3 Stunden seit der letzten Dosis vergangen sind. Das Produkt kann bis zu 3-mal innerhalb von 24 Stunden verabreicht werden.


Zur Linderung von Trennungsproblemen:

- Geben Sie die Dosis eine Stunde, bevor Sie den Hund allein lassen. Eine neue Dosis kann gegeben werden, wenn seit der letzten Dosis mindestens 3 Stunden vergangen sind. Das Produkt kann bis zu 3-mal innerhalb von 24 Stunden verabreicht werden.






1. Entfernen Sie den Verschluss der Flasche, indem Sie ihn nach unten drücken und drehen. Heben Sie den Verschluss für das Wiederverschließen auf.




2. Drücken Sie die in der Tessie®-Verpackung beiliegende orale Spritze fest in den Adapter an der Oberseite der Flasche.



3. Drehen Sie die Flasche mit der Spritze im Adapter auf den Kopf. Ziehen Sie den Kolben heraus, bis die schwarze Linie der korrekten Dosis (= vom Tierarzt verschriebene ml) unter der Griffplatte des Spritzenkörpers zu sehen ist. Lassen Sie die gefüllte Dosierspritze nicht unbeaufsichtigt.



4. Setzen Sie die Spritze vorsichtig in das Maul Ihres Hundes und verabreichen Sie die Dosis an den Zungengrund, indem Sie den Kolben langsam drücken, bis die Spritze leer ist. Geben Sie dem Hund ein kleines Leckerli, um sicherzustellen, dass er das Arzneimittel schluckt.



5. Setzen Sie die Kappe wieder auf und spülen Sie die Spritze nach Gebrauch mit Wasser aus. Legen Sie die Spritze und die Flasche zurück in die Schachtel und bewahren Sie sie im Kühlschrank auf.

Hinweise für die Person, die Tessie® verabreicht

Versehentliche Einnahme sowie Hautkontakt, einschließlich Hand-zu-Mund Kontakt sind zu vermeiden. Bei Augenkontakt spülen Sie die Augen sofort mit Wasser aus.

- Bei Hautkontakt waschen Sie die betroffene Haut sofort mit Wasser ab und entfernen Sie kontaminierte Kleidung. Bei versehentlicher Einnahme suchen Sie einen Arzt auf. Fahren Sie nicht Auto, da Schläfrigkeit und Blutdruckschwankungen auftreten können.
- Lassen Sie die gefüllte Dosierspritze nicht unbeaufsichtigt, während Sie den Hund auf die Verabreichung vorbereiten.
- Waschen Sie nach dem Gebrauch Ihre Hände.
- Nach dem Gebrauch die Tessie®-Flasche in den Karton zurücklegen und im Kühlschrank (2°C-8°C) für Kinder und Tiere unerreichbar aufbewahren
- Informieren Sie Ihren Tierarzt über andere Arzneimittel, die Ihr Hund bekommt.

Wie funktioniert Tessie®?

- Tessie® lindert situationsbedingte Angstzustände, die durch Geräusche oder Trennung ausgelöst werden.
- Hunde zeigen individuelle Anzeichen von Angst. Tessie® lindert die Angstzustände und mildert somit die Anzeichen, kann sie aber nicht immer vollständig beseitigen.
- Die Wirkung wird in der Regel innerhalb von 1 Stunde erreicht.

Unerwünschte Wirkungen

- Wie alle Arzneimittel kann Tessie® auch unerwünschte Wirkungen haben, die jedoch nicht bei allen Hunden auftreten. Wenn Sie solche feststellen, informieren Sie bitte Ihren Tierarzt.
- In klinischen Studien wurden sehr häufig (1 von 10 Hunden) Müdigkeit und Erbrechen als unerwünschte Wirkungen beobachtet. Zu den häufigen unerwünschten Wirkungen (1 von 100 Hunden) gehörten Schläfrigkeit, Verhaltensstörungen (Bellen, Meiden, Desorientierung, erhöhte Reaktivität), Blässe der Schleimhäute, Ataxie, Durchfall, unkontrolliertes Wasserlassen, Übelkeit, Gastroenteritis, übermäßiger Durst, niedrige Anzahl der weißen Blutkörperchen, allergische Reaktionen und Appetitlosigkeit.
- **Überdosierung** kann Schläfrigkeit, Senkung der Herzfrequenz, des Blutdrucks und der Körpertemperatur verursachen. In diesem Fall sollte der Hund warmgehalten werden. **Im Falle einer Überdosierung ist so schnell wie möglich ein Tierarzt aufzusuchen.**

Lagerung

- **Lagern Sie Tessie® im Kühlschrank (2°C bis 8°C)** und schützen Sie die Flasche vor Licht, indem Sie sie in der Schachtel aufbewahren.
- Die Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen der Flasche beträgt 12 Monate im Kühlschrank (2°C bis 8°C). Die Flasche kann für kurze Zeiträume (bis zu insgesamt 1 Monat) bei Raumtemperatur (15-25°C) gelagert werden.
- Nach Ablauf des Verfallsdatums ist das Arzneimittel nicht mehr zu verwenden.
- Bewahren Sie das Arzneimittel außerhalb der Reichweite und Sicht von Kindern und Tieren auf.

Häufige Anzeichen von Angst bei Hunden

Hunde, die unter situationsbedingten Angstzuständen leiden, können eine Vielzahl Von Anzeichen zeigen. Lernen Sie zu erkennen, wie Ihr Hund auf stressige Situationen reagiert.




Hecheln



**Zittern/
Schütteln**



Verstecken



Nahrungsverweigerung



Lautäußerung



Gähnen



Kauern



**Angelegte
Ohren und/oder
Stressfalten**



Lippenlecken




**Übermäßige
Wachsamkeit**




**Übertriebene
Anhänglichkeit**




**Unruhiges
Umherlaufen**



**"Walfischaugen",
weit geöffnete
Augen mit
sichtbarem Weiß**



**Angstbedingtes
Urinieren**



**Destruktives
Verhalten**



**Erhöhte
Herzfrequenz**



DÔMES PHARMA - TVM TIERGESUNDHEIT GMBH

REUCHLINSTRASSE 10-11, 10553 Berlin - DEUTSCHLAND

T: +49 (30) 23 59 23 200

E: kontakt@domespharma.com

www.domespharma.de